

	薬品名	投与量	手技	点滴時間
連日	ラゼルチニブ	240 mg/回	p.o.	1日1回
	<前投薬>アミバンタマブ投与30分~1時間前に内服 <b>Day 1, 2, 8, 15, 22</b> アセトアミノフェン(500)2錠 ジフェンヒドラミン(10)3錠			
Day 1	生理食塩液 デキサメタゾン	50 mL 9.9 mg	d.i.v.	15分
	生理食塩液	100 mL	d.i.v.	130 mL/h
	生理食塩液 アミバンタマブ	243 mL 350 mg/body	d.i.v.	フィルター付きライン を使用のこと
	<投与速度> 0~2時間:50 mL/h, 2時間以降:75 mL/h			
	生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
Day 2	生理食塩液 デキサメタゾン	50 mL 9.9 mg	d.i.v.	15分
	生理食塩液	100 mL	d.i.v.	130 mL/h
	生理食塩液 アミバンタマブ	229 mL 1050 mg/body	d.i.v.	フィルター付きライン を使用のこと
	<投与速度> 0~2時間:35 mL/h, 2時間以降:50 mL/h			
	生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
Day 8	生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
	生理食塩液 アミバンタマブ	222 mL 1400 mg/body	d.i.v.	65 mL/h フィルター付きライン を使用のこと
	生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
Day 15	生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
	生理食塩液 アミバンタマブ	222 mL 1400 mg/body	d.i.v.	85 mL/h フィルター付きライン を使用のこと
	生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
Day 22	生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
	生理食塩液 アミバンタマブ	222 mL 1400 mg/body	d.i.v.	125 mL/h フィルター付きライン を使用のこと
	生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用

\*併用投与開始後4ヶ月間は、アピキサバン(1回2.5mgを1日2回)併用

	薬品名	投与量	手技	点滴時間
連日	ラゼルチニブ	240 mg/回	p.o.	1日1回
	<前投薬>アミバンタマブ投与30分~1時間前に内服 Day 1, 15 アセトアミノフェン(500)2錠 ジフェンヒドラミン(10)3錠			
Day 1, 15	生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
	生理食塩液 アミバンタマブ	222 mL 1400 mg/body	d.i.v.	125 mL/h フィルター付きライン を使用のこと
	生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用

\*併用投与開始後4ヶ月間は、アピキサバン(1回2.5mgを1日2回)併用

	薬品名	投与量	手技	点滴時間
連日	ラゼルチニブ	240 mg/回	p.o.	1日1回
	<前投薬>アミバンタマブ投与30分~1時間前に内服 <b>Day 1, 2, 8, 15, 22</b> アセトアミノフェン(500)2錠 ジフェンヒドラミン(10)3錠			
Day 1	生理食塩液 デキサメタゾン	50 mL 9.9 mg	d.i.v.	15分
	生理食塩液	100 mL	d.i.v.	130 mL/h
	生理食塩液 アミバンタマブ	243 mL 350 mg/body	d.i.v.	フィルター付きライン を使用のこと
	<投与速度> 0~2時間:50 mL/h, 2時間以降:75 mL/h			
	生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
Day 2	生理食塩液 デキサメタゾン	50 mL 9.9 mg	d.i.v.	15分
	生理食塩液	100 mL	d.i.v.	130 mL/h
	生理食塩液 アミバンタマブ	236 mL 700 mg/body	d.i.v.	フィルター付きライン を使用のこと
	<投与速度> 0~2時間:50 mL/h, 2時間以降:75 mL/h			
	生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
Day 8	生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
	生理食塩液 アミバンタマブ	229 mL 1050 mg/body	d.i.v.	85 mL/h フィルター付きライン を使用のこと
	生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
Day 15, 22	生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
	生理食塩液 アミバンタマブ	229 mL 1050 mg/body	d.i.v.	125 mL/h フィルター付きライン を使用のこと
	生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用

\*併用投与開始後4ヶ月間は、アピキサバン(1回2.5mgを1日2回)併用

	薬品名	投与量	手技	点滴時間
連日	ラゼルチニブ	240 mg/回	p.o.	1日1回
	<前投薬>アミバンタマブ投与30分~1時間前に内服 Day 1, 15 アセトアミノフェン(500)2錠 ジフェンヒドラミン(10)3錠			
Day 1, 15	生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
	生理食塩液 アミバンタマブ	229 mL 1050 mg/body	d.i.v.	125 mL/h フィルター付きライン を使用のこと
	生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用

\*併用投与開始後4ヶ月間は、アピキサバン(1回2.5mgを1日2回)併用