

DCyBorD① 注射(1~2サイクル目)4週毎 全身性ALアミロイドーシス

薬品名	投与量	手技	点滴時間
<前投薬>ダラキューロ®投与1~3時間前に内服 Day 1, 8, 15, 22 アセトアミノフェン(500)2錠 ジフェンヒドラミン(10)5錠 * 1サイクル目のDay1のみモンテルカスト(10)1錠			
Day 1, 8, 15, 22			
グラニセトロンバッグ デキサメタゾン	100 mL 39.6 mg	d.i.v.	30分
生理食塩液	100 mL	d.i.v.	60分
ダラキューロ®	1800 mg/body	s.c.	3~5分かけて投与
生理食塩液 シクロホスファミド	100 mL 300 mg/m ²	d.i.v.	30分 最大500 mg
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
ボルテゾミブ 生理食塩液 (20mL) (1Vあたり生理食塩水1.2 mLで溶解)	1.3 mg/m ² 1本	s.c.	

DCyBorD② 注射(3~6サイクル目)

4週毎 全身性ALアミロイドーシス

	薬品名	投与量	手技	点滴時間
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <前投薬>ダラキューロ®投与1~3時間前に内服 Day 1, 15 アセトアミノフェン(500)2錠 ジフェンヒドラミン(10)5錠 </div>			
Day 1, 15	グラニセトロンバッグ デキサメタゾン	100 mL 39.6 mg	d.i.v.	30分
	生理食塩液	100 mL	d.i.v.	60分
	ダラキューロ®	1800 mg/body	s.c.	3~5分かけて投与
	生理食塩液 シクロホスファミド	100 mL 300 mg/m ²	d.i.v.	30分 最大500 mg
	生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
	ボルテゾミブ 生理食塩液 (20mL) (1Vあたり生理食塩水1.2 mLで溶解)	1.3 mg/m ² 1本	s.c.	
Day 8, 22	グラニセトロンバッグ デキサメタゾン	100 mL 39.6 mg	d.i.v.	30分
	生理食塩液 シクロホスファミド	100 mL 300 mg/m ²	d.i.v.	30分 最大500 mg
	生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
	ボルテゾミブ 生理食塩液 (20mL) (1Vあたり生理食塩水1.2 mLで溶解)	1.3 mg/m ² 1本	s.c.	

DCyBorD③ 注射(7サイクル目以降)

4週毎 全身性ALアミロイドーシス

	薬品名	投与量	手技	点滴時間
Day 1	レナデックス®	20 mg/body	p.o.	前投薬として内服
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <前投薬>ダラキューロ®投与1~3時間前に内服 Day 1 アセトアミノフェン(500)2錠 ジフェンヒドラミン(10)5錠 </div>			
	ダラキューロ®	1800 mg/body	s.c.	3~5分かけて投与